

## **Categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata**

**a) Soggetti di età  $\geq 60$  anni e  $< 65$  anni al 31/12/2020. Questa fascia d'età rappresenta una nuova categoria bersaglio, la cui raccomandazione si aggiunge a quella tradizionale per gli anziani. Si raccomanda fortemente la vaccinazione antinfluenzale in questa fascia d'età, anche a causa dell'emergenza COVID-19, al fine di facilitare la diagnosi differenziale nelle persone a maggior rischio di malattia grave per entrambe le patologie**

**b) Tutti i soggetti, anche sani, di età  $> 6$  mesi e  $< 6$  anni alla data di vaccinazione: nuova categoria bersaglio, introdotta dall'Ordinanza del Presidente n. Z00030/2020. Si raccomanda fortemente la vaccinazione antinfluenzale in questa fascia d'età, principale serbatoio del virus influenzale, anche al fine di ridurre la circolazione tra gli adulti e gli anziani nell'attuale fase pandemica**

**c) Donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo "postpartum". Va sottolineata l'importanza della vaccinazione antinfluenzale nelle donne in gravidanza, ricordando che l'OMS nel suo *position paper* più recente sull'influenza ritiene le gravide come il più importante dei gruppi a rischio per loro stesse e per il feto**

**d) Soggetti di età  $\geq 6$  anni e  $< 60$  anni affetti da:**

- malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio (inclusa l'asma grave, la displasia broncopulmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva - BPCO)
- malattie dell'apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite ed acquisite
- diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con BMI  $> 30$ )
- epatopatie croniche
- insufficienza renale/surrenale cronica
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
- tumori e in corso di trattamento chemioterapico
- malattie congenite o acquisite che comportino carenza di produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinale
- patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
- patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari)
- altre patologie che aumentano il rischio di gravi complicanze da influenza

**e) Soggetti di età  $\geq 6$  anni e  $< 18$  anni in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale**

**f) Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti**

**g) Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato)**

**h) Personale delle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria), Vigili del Fuoco e personale della protezione civile**

**i) Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte d'infezione da virus influenzali non umani:**

- allevatori
- addetti all'attività di allevamento
- addetti al trasporto di animali vivi
- macellatori e vaccinatori
- veterinari pubblici e libero-professionisti
- 

**l) Altri soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, quali (indicativamente):**

- altre forze armate
- personale degli asili nido, di scuole dell'infanzia e dell'obbligo
- addetti poste e telecomunicazioni

**m) Donatori di sangue.**