

## CALENDARIO VACCINALE 2024

Offerta vaccinale nella Regione Lazio.

| Vaccinazioni                      | A partire dal compimento del |                |                |         |                |          |                 |                 |          |                |          |                |          |          |
|-----------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|
|                                   | 2° mese                      | 3° mese        | 4° mese        | 5° mese | 10° mese       | 12° mese | 13°-15° mese    | 5° anno         | 11° anno | 12° anno       | 19° anno | 26° anno       | 60° anno | 65° anno |
| Esavalente                        | X                            |                | X              |         | X <sup>3</sup> |          |                 |                 |          |                |          |                |          |          |
| Pneumococco <sup>1</sup>          | X                            |                | X              |         | X <sup>3</sup> |          |                 | X <sup>11</sup> |          |                |          |                |          | X        |
| Rotavirus                         | X                            | X <sup>2</sup> | X <sup>2</sup> |         |                |          |                 |                 |          |                |          |                |          |          |
| Meningococco B <sup>1</sup>       |                              | X              |                | X       |                |          | X <sup>3</sup>  |                 |          | X <sup>4</sup> |          |                |          |          |
| Meningococco ACWY <sup>1</sup>    |                              |                |                |         |                |          | X               |                 |          | X <sup>4</sup> |          |                |          |          |
| MPR - Morbillo, Parotite, Rosolia |                              |                |                |         |                |          | X               | X               |          | X <sup>5</sup> |          |                |          |          |
| Varicella                         |                              |                |                |         |                |          | X <sup>6</sup>  | X <sup>6</sup>  |          | X <sup>5</sup> |          |                |          |          |
| Tetraivalente (dTpa-polio)        |                              |                |                |         |                |          |                 | X               |          | X <sup>7</sup> |          | X <sup>8</sup> |          |          |
| Papillomavirus <sup>1</sup>       |                              |                |                |         |                |          |                 |                 |          | X <sup>9</sup> |          |                |          |          |
| Herpes Zoster <sup>1</sup>        |                              |                |                |         |                |          |                 |                 |          |                |          |                |          | X        |
| Influenza <sup>1</sup>            |                              |                |                |         |                |          | X <sup>10</sup> |                 |          |                |          |                |          | X        |

<sup>1</sup> È offerto gratuitamente non solo per età, ma anche per patologia o per condizioni che aumentano il rischio della malattia.

<sup>2</sup> Dipende dal vaccino utilizzato (ciclo a due o a tre dosi).

<sup>3</sup> A distanza minima di 6 mesi dal ciclo primario

<sup>4</sup> Ad almeno 5 anni da una precedente dose di vaccino contro meningococco e fino al compimento dei 18 anni e 364 giorni.

<sup>5</sup> Catch up per i soggetti che non hanno due dosi di MPR-V.

<sup>6</sup> Preferire la somministrazione in unico vaccino (MPR-V).

<sup>7</sup> Preferire la formulazione per adulti

<sup>8</sup> Proporre una dose di dTpa adulti ogni 10 anni

<sup>9</sup> Femmine e maschi (a partire dalla coorte del 2006) dal compimento degli 11 anni fino al compimento dei 26 anni

<sup>10</sup> A partire dai 6 mesi fino al compimento dei 7 anni.

<sup>11</sup> Catch up per i soggetti non vaccinati fino a 18 anni a partire dalla coorte di nascita del 2012 in poi